



Μακροχρόνια χορήγηση RTX στις ANCA-αγγειίτιδες



Προκειμένου να εκτιμηθεί η σημασία (πρόληψη εξάρσεων) της μακροχρόνιας (επιπλέον του κλασικού σχήματος) χορήγησης Rituximab (RTX) σε ασθενείς με σχετιζόμενες με ANCA αγγειίτιδες

(*granulomatosis with polyangiitis (GPA)* ή

microscopic polyangiitis (MPA)) στους οποίους έχει επιτευχθεί πλήρης ύφεση με σχήμα RTX 18 μηνών:

- 68 ασθενείς με GPA και 29 με MPA (σε ύφεση, μετά από την 1^η φάση διατήρησης ύφεσης 18 μηνών) από 39 κέντρα στην Γαλλία, τυχαιοποιήθηκαν σε περαιτέρω αγωγή με RTX ή placebo (4 εγχύσεις)


Η στρατηγική αυτή είχε σαν αποτέλεσμα

μικρότερη συχνότητα εξάρσεων νόσου σε σχέση με την κλασική

θεραπεία (διάστημα χωρίς έξαρση την 28 εβδ : 96% (95% CI, 91% - 100%) και 74% (CI, 63% - 88%) αντίστοιχα)

Όσον αφορά τις σοβαρές ανεπιθύμητες δράσεις, τουλάχιστον 1 διαπιστώθηκε σε:

- 12 ασθενείς (24%) υπό rituximab (9 σοβαρού βαθμού λοιμώξεις σε 6 ασθενείς [12%]) και σε
- 14 ασθενείς (30%) υπό placebo (6 σοβαρού βαθμού λοιμώξεις σε 4 ασθ [9%])



Long-Term Rituximab Use to Maintain Remission of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis: A Randomized Trial. Pierre Charles , Élodie Perrodeau, et al *Ann Intern Med*. 2020 Jun 2. doi: 10.7326/M19-3827. Online ahead of print

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της **ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ** και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο