



## Αυτοάνοσα νοσήματα στον CLE

New Online Views 399 | Citations 0 | Altmetric 18

ONLINE FIRST

### Brief Report

May 2, 2018

## Autoimmune Diseases in Patients With Cutaneous Lupus Erythematosus

Elaine Kunzler, BS<sup>1,2</sup>; Linda S. Hynan, PhD<sup>3,4</sup>; Benjamin F. Chong, MD, MScS<sup>1</sup>

> Author Affiliations

JAMA Dermatol. Published online May 2, 2018. doi:10.1001/jamadermatol.2018.0616

Μεταξύ ασθενών με CLE (Cutaneous lupus erythematosus (CLE), χωρίς SLE), το **17,8%** φαίνεται να έχει **συνυπάρχουσα αυτοάνοση νόσο**, με πιο συχνή αυτή της αυτοάνοσης

νόσου του θυρεοειδούς.

Τα ευρήματα προέρχονται από πρόσφατη μελέτη (*cross-sectional study*) με 129 συμμετέχοντες. Σε 23 ασθενείς διαπιστώθηκαν αυτοάνοσες καταστάσεις, 6 εκ των οποίων (4.7%) είχαν αυτοάνοση νόσο θυρεοειδούς.

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο για κάτι τέτοιο ήταν ασθενείς :

- λευκής φυλής (*odds ratio [OR], 2.88; 95% CI, 1.00-8.29; P = .0498*)
- χωρίς ιστορικό καπνίσματος
- με οικογενειακό ιστορικό αυτοάνοσης νόσου
- με παρουσία ANA

*Autoimmune Diseases in Patients With Cutaneous Lupus Erythematosus. Elaine Kunzler, Linda S. Hynan, Benjamin F. Chong. JAMA Dermatol. Published online May 2, 2018. doi:10.1001/jamadermatol.2018.0616*

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.