




Συνχορήγηση csDMARDs με TNFi στην axSpA



Δεδομένα από μια προοπτική κούρτη ασθενών (axSpA cohort / SCQM-axSpA), με 1214 ασθενείς με αξονική

σπονδυλοαρθροπάθεια (axSpA) υπό TNF-α αναστολή (2.765 TNFi treatment courses), εκ των οποίων το 20,4% λάμβανε συνχορήγηση με csDMARDs

- Στην ομάδα υπό **μονοθεραπεία παρατηρήθηκε σημαντικά μικρότερη διατήρηση** του TNF-α αναστολέα, σε σχέση με την ομάδα συνδυασμού (32,7 vs 39,1 μήνες, $p=0,04$)
- Το φαινόμενο ήταν πιο σημαντικό σε ασθενείς υπό infliximab
- Η κλινική απόκριση, στον 1ο χρόνο θεραπείας, ήταν παρόμοια μεταξύ των 2 ομάδων

The effect of comedication with a csDMARD on drug retention and clinical effectiveness of anti-TNF therapy in patients with axial spondyloarthritis. Nissen MJ1, Ciurea A2, Bernhard J3, Tamborini G4, Mueller R5, Weiss B6, Toniolo M2, Exer P7, Gabay C1, Finckh A1; physicians of the Swiss Clinical Quality Management (SCQM) Cohort. Arthritis Rheumatol. 2016 Mar 25. doi: 10.1002/art.39691. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη