



Κατάθλιψη και ανάπτυξη ΣΕΛ



Η κατάθλιψη είναι δυνατό να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ΣΕΛ, (κίνδυνος *HR*, 2.67; 95% *CI*, 1.91-3.75; $P < .001$, σε σχέση με άτομα χωρίς κατάθλιψη) σύμφωνα με μια προοπτική, διάρκειας 20 ετών, πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο JAMA, με στοιχεία από 2 κοόρτες (*Nurses' Health Study* (1996-2012) και *Nurses' Health Study II* (1993-2013) (συνολικά 194 483 γυναίκες)

Roberts AL, Kubzansky LD, Malspeis S, Feldman CH, Costenbader KH. Association of Depression With Risk of Incident Systemic Lupus Erythematosus in Women Assessed Across 2 Decades. *JAMA Psychiatry*. Published online September 12, 2018. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2462

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ [ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.