




Θνησιμότητα σε ασθενείς με RA και ILD



Η διάμεση πνευμονική νόσος (ILD) αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή της RA, με **σημαντικά αυξημένη θνησιμότητα**, σε σχέση με

ασθενείς με RA χωρίς ILD, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (population-based cohort study) με δεδομένα από το εθνικό αρχείο Δανίας, όπου 679 ασθενείς με RA-ILD συγκρίθηκαν με 11.722 «παρόμοιους» ασθενείς με RA χωρίς ILD:

- ILD διαπιστώθηκε στο 2.2% των ασθενών με RA. Στο 34% αυτών η διάγνωση έγινε στο διάστημα 1 χρόνο πριν έως 1 χρόνο μετά τη διάγνωση RA
- η θνησιμότητα, για ασθενείς με Vs χωρίς ILD ήταν :
 - στον 1^ο χρόνο, **13.9%** (95% CI, 11.4% - 16.7%) vs **3.8%** (95% CI, 3.5% - 4.2%)
 - τον 5^ο χρόνο, 39.0% (34.4% - 43.5%) vs 18.2% (17.3% - 19.1%)
 - τον 10^ο χρόνο, 60.1% (52.9% - 66.5%) vs 34.5% (32.8% - 36.1%)
- Ο σχετικός κίνδυνος για θάνατο ήταν από 2-10 φορές μεγαλύτερος στους ασθενείς με ILD και κυρίως :
 - τους **πρώτους μήνες** διάγνωσης
 - σε αυτούς με διάγνωση RA πριν την διάγνωση ILD
 - σε **άνδρες** ασθενείς

A population-based cohort study of rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: comorbidity and mortality. Hylgaard C1, Hilberg O2, Pedersen AB3, Ulrichsen SP3, Løkke A1, Bendstrup E1, Ellingsen T4,5. *Ann Rheum Dis.* **2017 Jun 13.** pii: [annrheumdis-2017-211138](https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-211138). doi: [10.1136/annrheumdis-2017-211138](https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-211138). [Epub ahead of print]

[ΜΕΤΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ US ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ILD](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και **όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη**.