
Μυκοφαινολικό στο σκληρόδερμα (συστ. ανασκόπηση)



Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε Medline, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials, CINAHL, όπου ανεβρέθησαν **21 μελέτες με 487 ασθενείς** με συστηματική σκλήρυνση που έλαβαν mycophenolate

- Διαπιστώθηκαν 18 θάνατοι και 90 μη θανατηφόρα ανεπιθύμητα συμβάματα, εκ των οποίων 43 (47,7%) ήταν από το **γαστρεντερικό**, 34 (26%) λοιμώξεις, 6 (5%) επεισόδια κυτταροπενίας και 2 (2%) νεοπλασίες
- Από το γαστρεντερικό, τα πιο συχνά ήταν διάρροια (n=18 (14%)), ναυτία (n=12 (9%)) και κοιλιακό άλγος (n=3 (2%))
- Η διακοπή του φαρμάκου κυμάνθηκε από 8-40%
- Σε 7 μελέτες παρατήρησης αναφέρθηκε βελτίωση ή σταθεροποίηση του **FVC**
- Σε 5 μελέτες φάνηκε βελτίωση ή σταθεροποίηση του **modified Rodnan skin score**

Safety and effectiveness of mycophenolate in systemic sclerosis. A systematic review. Omair MA, Alahmadi A, Johnson S3. PLoS One. 2015 May 1;10(5):e0124205. doi: 10.1371/journal.pone.0124205. eCollection 2015

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη