



Το πιο αποτελεσματικό ΜΣΑΦ στην ΟΑ



Η δικλοφαινάκη, στην δόση των 150 mg/ημ, φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό ΜΣΑΦ σε ασθενείς με ΟΑ (γόνατος ή ισχίου), τουλάχιστον σε θέματα βελτίωσης πόνου και λειτουργικότητας, σύμφωνα με πρόσφατη

μετανάλυση της βιβλιογραφίας (*network meta-analysis*: *Cochrane Central Register of Controlled Trials*, 76 RCTs / 58.451 ασθενείς). Οι συγγραφείς τονίζουν :

- στην επιλογή του ΜΣΑΦ και της δόσης αυτού, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γνωστό προφίλ ασφάλειας των φαρμάκων αυτών
- η παρακεταμόλη, ανεξαρτήτως δόσης, ως μονοθεραπεία, δε φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο στην ΟΑ

Μαζί με τη δικλοφαινάκη 150 mg/d, η **etoricoxib 60 mg/day** ήταν οι 2 θεραπευτικές επιλογές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αποτελούν την καλύτερη παρέμβαση (100% πιθανότητα να φτάσουν την ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά)

Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Bruno R da Costa, PhD, †, Stephan Reichenbach, MD, †, Noah Keller, MMed, Linda Nartey, MD, Simon Wandel, PhD, Prof Peter Jüni, MD, †, Dr Sven Trelle, MD, The Lancet Volume 390, Issue 10090, 8-14 July 2017, Pages e21-e33

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη.