




Βιολογικοί παράγοντες & κύηση



Η χορήγηση βιολογικών πριν ή κατά τη διάρκεια της κύησης ΔΕΝ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο

πρώωρου τοκετού ή

γεννήσεις νεογνών μικρών (σε βάρος) για την ηλικία κύησης (SGA), σύμφωνα με μελέτη παρατήρησης σε πληθυσμιακή ομάδα, όπου 109 γυναίκες (120 κύησεις) με αυτοάνοσο νόσημα εκτέθηκαν σε βιολογικό παράγοντα 3 μήνες πριν την κύηση ή κατά τη διάρκεια αυτής.

- Στην μη-προσαρμοσμένη ανάλυση (unadjusted analyses), ο κίνδυνος (ORs) για πρώωρους τοκετούς ήταν 1.64 (95% CI 1.02 - 2.63), ενώ για SGA 1.34 (95% CI 0.72 - 2.51)
- Μετά από «αντιστοίχιση» (matching) με περιπτώσεις εγκυμοσύνης χωρίς έκθεση σε βιολογικό, ο αντίστοιχος κίνδυνος διαμορφώθηκε σε **1.13** (95% CI 0.67 - 1.90) και **0.91** (95% CI 0.46 - 1.78)

Risk of preterm delivery and small-for-gestational-age births in women with autoimmune disease using biologics before or during pregnancy: a population-based cohort study. Tsao NW, Sayre EC, Hanley G, Sadatsafavi M, Lynd LD, Marra CA, De Vera MA. Ann Rheum Dis. 2018 Mar 1. pii: annrheumdis-2018-213023. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213023. [Epub ahead of print]

[ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ EULAR \(2/2016\) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟ](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.