



Παλίνδρομος ρευματισμός και ΡΑ

> J Rheumatol. 2020 May 1;47(5):652-657. doi: 10.3899/jrheum.190061. Epub 2019 Aug 1.

Rheumatoid Arthritis Initiating as Palindromic Rheumatism: A Distinct Clinical Phenotype?

Raul Castellanos-Moreira^{1 2}, Sebastian C Rodriguez-Garcia^{1 2}, José A Gómez-Puerta^{1 2}, Virginia Ruiz-Esquide^{1 2}, Oscar Camacho^{1 2}, Julio Ramírez^{1 2}, Andrea Cuervo^{1 2}, Rosa Morlà^{1 2}, Juan D Cañete^{1 2}, Isabel Haro^{1 2}, Raimon Sanmarti^{3 4}

Αναδρομική
μελέτη (με
σχετικά μικρό
αριθμό
ασθενών με
ΡΑ, n= 158)

στην οποία φάνηκε ότι σε ένα ποσοστό ασθενών (18%)

με εγκατεστημένη ΡΑ προϋπήρχε εικόνα παλίνδρομου ρευματισμού.

- Ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με ασθενείς με ΡΑ χωρίς παλίνδρομο ρευματισμό δεν φάνηκαν, εκτός από το κάπνισμα και την πιο συχνή χορήγηση υδροξυχλωροκίνης, στην ομάδα του παλίνδρομου ρευματισμού
- Ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι **εξάρσεις εικόνας παλίνδρομου ρευματισμού επέμεναν κατά τη διάρκεια της ΡΑ** ακόμη και σε ασθενείς σε ύφεση ή ακόμη και σε αυτούς υπό βιολογικούς παράγοντες

Castellanos-Moreira R, Rodriguez-Garcia SC, Gómez-Puerta JA, et al. Rheumatoid Arthritis Initiating as Palindromic Rheumatism: A Distinct Clinical Phenotype?. J Rheumatol. 2020;47(5):652-657. doi:10.3899/jrheum.190061

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.