




ΨΑ στην ψωρίαση, ΤΕΛΙΚΟ !



Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάλυση 266 μελετών με 976.408 ασθενείς με ψωρίαση φάνηκε ότι το 19.7% (18.5%-20.9%) αυτών είχε ΨΑ.

Το ποσοστό αυτό:

- ήταν πολύ μικρότερο για παιδιά και εφήβους (3,3%)
- φάνηκε υψηλότερο για ασθενείς από την **Ευρώπη** [22.7% (20.6%-25.0%) Vs 21.5% (15.4%-28.2%) για την **Νότια Αμερική**, 19.5% (17.1%-22.1%) για τη **Βόρεια Αμερική**, 15.5% (0.009%-51.5%) για την **Αφρική** και 14.0% (11.7%-16.3%) για ασθενείς από την **Ασία**]
- ήταν μεγαλύτερο με την εφαρμογή κριτηρίων CASPAR (23,8%)

Prevalence of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: A systematic review and meta-analysis of observational and clinical studies. Alinaghi F1, Calov M1, Kristensen LE2, Gladman DD3, Coates LC4, Jullien D5, Gottlieb AB6, Gisondi P7, Wu JJ8, Thyssen JP1, Egeberg A9. J Am Acad Dermatol. 2018 Jun 18. pii: S0190-9622(18)32149-2. doi: 10.1016/j.jaad.2018.06.027. [Epub ahead of print]

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ERENEWS

Συστάσεις για την αντιμετώπιση της ΨΑ από την [GRAPPA](#) (2016) και την [EULAR](#) (2015)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.