



Οι αντι-TNF-α σχετίζονται με ΑΥ (συστ. ανασκόπηση & μετανάλυση)

Medicine®

Έρευνα σε βάσεις δεδομένων όπως Embase, PubMed, the Cochrane Library και clinical trial registration Web site, από όπου επιλέχθηκαν 11 **RCTs** μελέτες με 6321 ασθενείς με **PA**

- η συνολική επίπτωση της σχετιζόμενης με αντι-TNF παράγοντες υπέρτασης ήταν 3.25% (95% CI: 1.51%–6.89%)
- η χρήση αντι-TNF-α παραγόντων σχετίστηκε με σημαντική αύξηση του κινδύνου για ανάπτυξη υπέρτασης (OR = 1.8896, 95% CI: 1.35–2.65).
- τα ευρήματα δεν τροποποιούνταν παραλείποντας κάποια μελέτη ενώ δεν διαπιστώθηκε συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης (publication bias)

Association Between Anti-TNF Therapy for Rheumatoid Arthritis and Hypertension: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Zhao, Qingwei MD; Hong, Dongsheng MD; Zhang, Yi PhD; Sang, Yanlei PhD; Yang, Zhihai; Zhang, Xingguo MD *Medicine: April 2015 - Volume 94 - Issue 14 - p e731 doi: 10.1097/MD.0000000000000731*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη