
"Head 2 head" anti-lymphotoxin- α Vs adalimumab



Το **Pateclizumab** (*anti-lymphotoxin-alpha; MLTA3698A - humanized monoclonal antibody that blocks and depletes anti-LT α , 360 mg sc /2w*) συγκρίθηκε σε φάσης II RCT μελέτη με το adalimumab σε 214 ΡΑ ασθενείς με ανθεκτική σε DMARDs νόσο και φάνηκε ότι είναι ασφαλές (σοβαρές ΑΕ : 0% με *pateclizumab*, 5.9% με *adalimumab* και 2.3% με *placebo*) αλλά **δε βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό σημεία και συμπτώματα** της νόσου μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας (μείωση *DAS28(4)-ESR* -1.89 , *placebo* -1.54 , *adalimumab* -2.52)

Efficacy and safety of pateclizumab (anti-Lymphotoxin- α) compared to adalimumab in rheumatoid arthritis: a head-to-head phase 2 randomized controlled study (The ALTARA Study). Kennedy WP, Simon J, Offutt C, Horn P, Herman A, Townsend M, Tang MT, Grogan JL, Hsieh F, Davis JC. Arthritis Res Ther. 2014 Oct 30;16(5):467. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη