

## Certolizumab...τώρα και στην ΨΑ

Φάσης III, 24 εβδομάδων, RCT μελέτη, με 409 ΨΑ ασθενείς, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 1:1:1 placebo, 200 mg Certolizumab (CZP) κάθε 2 εβδομάδες (Q2W) ή 400 mg CZP κάθε 4 εβδομάδες (Q4W)

- 368 ασθενείς συμπλήρωσαν το διάστημα παρακολούθησης των 24 εβδομάδων
- ACR20 απόκριση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με CZP 200 mg Q2W και 400 mg Q4W-από ότι με placebo (58.0% και 51.9% vs 24.3% ( $p < 0.001$ )) την 12η εβδομάδα, με την βελτίωση να παρατηρείται από την 1η εβδομάδα
- Στατιστικά σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στην φυσική δραστηριότητα (HAQ-DI) σε ασθενείς υπό CZP σε σχέση με το placebo (-0.50 vs -0.19,  $p < 0.001$ )
- Περισσότεροι ασθενείς υπό CZP 200 mg Q2W και CZP 400 mg πέτυχαν βελτίωση στο PsARC την 24η εβδομάδα σε σχέση με το placebo (78.3% και 77.0% vs 33.1% ( $p < 0.001$ ))
- Βελτιώσεις παρατηρήθηκαν στην προσβολή του δέρματος, ενθεσίτιδα, δακτυλίτιδα, και προσβολή νυχιών
- Η βελτίωση στο ACR20 με το φάρμακο ήταν ανεξάρτητη προηγηθείσας έκθεσης σε αντι-TNF-α παράγοντες

*Effect of certolizumab pegol on signs and symptoms in patients with psoriatic arthritis: 24-week results of a Phase 3 double-blind randomised placebo-controlled study (RAPID-PsA). Mease PJ, Fleischmann R, Deodhar AA, Wollenhaupt J, Khraishi M, Kielar D, Woltering F, Stach C, Hoepken B, Arledge T, van der Heijde D. **Ann Rheum Dis.** 2013 Aug 28. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203696. [Epub ahead of print]*