

Παράγοντες κινδύνου για έξαρση στον ΣΕΛ

RHEUMATOLOGY

Προοπτική μελέτη διάρκειας 24 μηνών με 202 ασθενείς με ΣΕΛ (1083 επισκέψεις)

- 16.8% των ασθενών παρουσίασε έξαρση νόσου (SLEDAI-2K score ≥ 4 points)
- Προγνωστικό ρόλο είχαν οι κλινικοί παράγοντες: **διάγνωση ΣΕΛ ≤ 25 ετών** (HR = 2.14, P = 0.03), νεφρική προσβολή πριν την έναρξη της μελέτης (HR = 4.78, P < 0.0001) και ανοσοκατασταλτική αγωγή για σοβαρής μορφής ΣΕΛ (HR = 3.22, P < 0.001)
- Ενεργότητα νόσου στην αρχή, διάρκεια νόσου και αγωγή με πρεδνιζόνη ή HCQ δεν αποτελούσαν προγνωστικούς παράγοντες

Identification of clinical predictors of flare in systemic lupus erythematosus patients: a 24-month prospective cohort study. Inês L, Duarte C, Silva RS, Teixeira AS, Fonseca FP, da Silva JA. Rheumatology (Oxford). 2014 Jan;53(1):85-89. Editor's Choice

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης