

Ελπιδοφόρα ευρήματα για θεραπεία στο Σύνδρομο Sjögren

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

Ανοιχτή προοπτική μελέτη, φάσης II, διάρκειας ενός έτους, με 30 ασθενείς με πρωτοπαθές Σύνδρομο Sjögren, με σκοπό να εκτιμηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του belimumab (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι BAFF (B-cell activating factor), 10 mg/kg) και πρωταρχικό στόχο την βελτίωση σε 2/5: $\geq 30\%$ βελτίωση στην ξηρότητα, στην κόπωση, στον πόνο, στη συστηματική ενεργότητα, $\geq 25\%$ βελτίωση σε κάποιον από τους δείκτες ενεργότητας B κυττάρου

- Ο πρωταρχικός στόχος επιτεύχθηκε σε **18/30 ασθενείς (60%)**
- Ο δείκτης ενεργότητας νόσου (EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index) μειώθηκε από 8.8 (7.4) σε 6.3 (6.6) ($p=0.0015$)
- Ο αναφερόμενος από τους ασθενείς δείκτης (EULAR Sjögren's Syndrome Patient Reported Index) μειώθηκε από 6.4 (1.1) σε 5.6 (2.0) ($p=0.0174$)
- Το VAS για την ξηρότητα, κόπωση και πόνο διακυμάνθηκε αντίστοιχα: από 7.8 (1.8) σε 6.2 (2.9) ($p=0.0021$), 6.9 (1.8) σε 6.0 (2.2) ($p=0.0606$) και από 4.6 (2.6) σε 4.7 (2.4) ($p=0.89$)
- Σιελική ροή και Schirmer's test δεν επηρεάστηκαν

Efficacy and safety of belimumab in primary Sjögren's syndrome: results of the BELISS open-label phase II study. Xavier Mariette, Raphaële Seror, Luca Quartucci, Gabriel Baron, Sara Salvin, Martina Fabris, Frederic Desmoulins1, Gaétane Nocturne, Philippe Ravaud, Salvatore De Vita Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2013-203991. Published Online First 17 December 2013

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης