

Λιπίδια & απόκριση στην στατίνη στην PA

Σε 161 PA ασθενείς και 221 χωρίς PA άτομα έγινε σύγκριση των επιπέδων των λιπιδίων πριν και μετά την έναρξη στατινών

- Πριν την έναρξη στατινών, **τα επίπεδα της ολικής χοληστερίνης και της LDL ήταν χαμηλότερα στους PA ασθενείς** σε σχέση με άτομα χωρίς PA
- Η απόλυτη και ποσοστιαία αλλαγή των επιπέδων 90 ημέρες μετά την χρήση στατινών είχε την τάση να είναι μικρότερη στους PA ασθενείς ($P = 0.03$ και $P = 0.09$)
- 90 ημέρες μετά τη χρήση στατινών, οι **PA ασθενείς ήταν λιγότερο πιθανό να επιτύχουν το θεραπευτικό στόχο** σε σχέση με άτομα χωρίς PA. Η αυξημένη ΤΚΕ στην αρχή της μελέτης σχετίστηκε με μικρότερη πιθανότητα για επίτευξη του θεραπευτικού στόχου

*Impact of Statin Use on Lipid Levels in Statin-Naive Patients With Rheumatoid Arthritis Versus Non-Rheumatoid Arthritis Subjects: Results From a Population-Based Study. Elena Myasoedova, Sherine E. Gabriel, Abigail B. Green, Eric L. Matteson, Cynthia S. Crowson. **Arthritis Care & Research**. Volume 65, Issue 10, pages 1592–1599, October 2013. Article first published online: **24 SEP 2013***