



Η αρθρίτιδα στο Σ. Lofgren ...δεν είναι αρθρίτιδα !

Arthritis Care & Research

Οι ασθενείς με οξεία σαρκοείδωση προσέρχονται συχνά με επώδυνο οίδημα αστραγάλων, εικόνα αρθρίτιδας, χαρακτηριστικής του συνδρόμου Lofgren. Στην συγκεκριμένη μελέτη εκτιμήθηκαν υπερηχογραφικά οι ποδοκνημικές 36 ασθενών με σύνδρομο Lofgren

- Η πλειονότητα των ασθενών (26/36, 72,2 %) **ΔΕΝ είχε τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά της οξείας αρθρίτιδας** (διάταση κάψουλας, PD αγγειοβρίθεια)
- υγρό στην ποδοκνημική παρατηρήθηκε σε 9/36 ασθενείς και αυτό με ήπια χαρακτηριστικά (σε 8/9 ασθενείς ήταν βαθμού I)
- σε 23/25 ασθενείς ανιχνεύθηκε εκτεταμένο **υποδερμικό οίδημα**, ενδεικτικό περιαρθρίτιδας, ενώ τενοντοϋμενίτιδα σε 14 (38.8%)

Evaluation of Ankle Swelling Due to Lofgren's Syndrome: A Pilot Study Using B-Mode and Power Doppler Ultrasonography. E. Le Bras, B. Ehrenstein, M. Fleck, W. Hartung. Arthritis Care & Research Volume 66, Issue 2, pages 318–322, February 2014. Article first published online: 28 JAN 2014. DOI: 10.1002/acr.22099

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη