



Αυτο-αντισώματα στην ΨΑ

Στη μελέτη, και σε σχέση με υγιείς μάρτυρες, διαπιστώθηκαν σε αυξημένους τίτλους αρκετά αυτο-αντισώματα ορού σε

ασθενείς με ψωρίαση και κυρίως IgG αυτο-

αντισώματα έναντι δύο νέων αντιγόνων, LL37 και ADAMTSL5.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα επίπεδα ορού των αυτοαντισωμάτων έναντι LL37 ή ADAMTSL5 σχετίστηκαν με :

- το δείκτη PASI (Psoriasis Area and Severity Index)
- την εξέλιξη της νόσου, αφού ήταν σημαντικά αυξημένα σε ασθενείς με ΨΑ σε σχέση με ασθενείς με ψωρίαση χωρίς αρθρίτιδα, εύρημα συμβατό ότι τα αυτο-αντισώματα αυτά πιθανώς να εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου

Identification of Novel Autoantibodies Associated with Psoriatic Arthritis. Yuan Y1,2, Qiu J2, Lin ZT2, Li W3, Haley C4, Mui UN4, Ning J3, Tying SK4,5, Wu T2. Arthritis Rheumatol. 2019 Jan 7. doi: 10.1002/art.40830. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.