



MTX σε RA ασθενείς με χρόνια HBV

Δεδομένα από το National Health Insurance Research Database in Taiwan όπου διαπιστώθηκαν 631 ασθενείς με RA και χρόνια ηπατίτιδα Β (CHB) (358 υπό MTX και 273 χωρίς MTX)

- Μετά από μια μέση παρακολούθηση 6 ετών από την διάγνωση CHB, 41 (6.5%) ασθενείς ανέπτυξαν ηπατική κίρρωση
- Δεν φάνηκε αυξημένος κίνδυνος για ηπατική κίρρωση μεταξύ ασθενών με μακροχρόνια λήψη MTX. Ηπατική κίρρωση

δεν φάνηκε ακόμη και μεταξύ ασθενών με συνολική δόση MTX ≥ 3 grams μετά από 97 μήνες αγωγής

[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Methotrexate is not associated with increased liver cirrhosis in a population-based cohort of rheumatoid arthritis patients with chronic hepatitis B. Kuo-Tung Tang, Wei-Ting Hung, Yi-Hsing Chen, Ching-Heng Lin & Der-Yuan Chen. Scientific Reports 6, Article number: 22387 (2016) doi:10.1038/srep22387. Published online: 01 March 2016

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ κ ΑΧ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ