



Διαφορές μεταξύ AS και nr-axial SpA



Δεδομένα από το South Swedish Arthritis Treatment Group register με σύγκριση ασθενών με Nr-axSpA και AS (n = 86/238). Οι ασθενείς με Nr-axSpA:

- Ήταν πιο συχνά γυναίκες
- Είχαν χαμηλότερους τίτλους πρωτεϊνών οξείας φάσης στην αρχή
- Η CRP παρέμεινε χαμηλότερη σε όλη την διάρκεια παρακολούθησης (3 χρόνια)

Άλλες διαφορές, όπως κλινικές εκδηλώσεις, έκβαση ή παραμονή στη θεραπεία με TNF-α αναστολή, δεν φάνηκαν

Η αρχικά αυξημένη CRP, ήταν δείκτης καλής κλινικής απόκρισης και παραμονής στη θεραπεία, παρόμοια και στις 2 ομάδες



Οι συγγραφείς καταλήγουν υποστηρίζοντας ότι οι **2 διαγνώσεις αποτελούν διαφορετικές μορφές / φάσεις της ίδια νόσου**

Comparison of non-radiographic axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis patients - baseline characteristics, treatment adherence, and development of clinical variables during three years of anti-TNF therapy in clinical practice. Wallman JK1,2, Kapetanovic MC3, Petersson IF4,5, Geborek P6, Kristensen LE7,8. Arthritis Res Ther. 2015 Dec 24;17(1):378. doi: 10.1186/s13075-015-0897-6.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη