
Διακοπή κάθε Θεραπείας στην ΡΑ ?

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

Δεδομένα από την μελέτη AVERT (φάσης 3b, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη), όπου ασθενείς με πρώιμη ΡΑ τυχαιοποιήθηκαν σε 3 θεραπευτικές ομάδες : subcutaneous abatacept 125 mg και MTX, abatacept 125 mg μονοθεραπεία ή MTX για 12 μήνες. Στους ασθενείς με χαμηλή ενεργότητα νόσου (DAS28CRP < 3,2) γινόταν στη συνέχεια πλήρης διακοπή κάθε αγωγής για ένα διάστημα 12 μηνών

- DAS28CRP < 2,6 στους 12 μήνες επιτεύχθηκε στο 60.9% της ομάδας ABA + MTX Vs 45.2% (p=0.010) στην ομάδα MTX Vs 42,5 % για την ABA μονοθεραπεία
- **Μετά την πλήρη διακοπή ΚΑΘΕ Θεραπείας , DAS28CRP < 2,6 διατηρήθηκε στο 14.8% Vs 7.8% (p=0.045) Vs 12,4 %**, αντίστοιχα
- Και οι δύο ομάδες με ABA είχαν προφίλ ασφάλειας παρόμοιο της MTX

Evaluating drug-free remission with abatacept in early rheumatoid arthritis: results from the phase 3b, multicentre, randomised, active-controlled AVERT study of 24 months, with a 12-month, double-blind treatment period. Emery P1, Burmester GR2, Bykerk VP3, Combe BG4, Furst DE5, Barré E6, Karyekar CS7, Wong DA7, Huizinga TW8 Ann Rheum Dis. 2014 Nov 3. pii: annrheumdis-2014-206106. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206106. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη