
Χορήγηση MTX και μετά από αυτή, στις ΗΠΑ

Arthritis Care & Research

Δεδομένα για την περίοδο 2006-2011 με βάση τα U.S. commercial health plan (USCHP) και U.S. Medicare program

- Στο εθνικό σύστημα ασφάλειας (Medicare) ανεβρέθησαν **20.406 νέοι** χρήστες MTX, εκ των οποίων το 77% ήταν γυναίκες
- Το 32% έμεινε στην MTX και στην ίδια αρχική δόση (**το 22% στα 7,5 mg/w και το 23% στα 10 mg/w**). Μόνο το 39% πήρε δόσεις > 20mg/w
- Μετά το πρώτο έτος θεραπείας, το **76% έμεινε στην από του στόματος MTX** (με ή χωρίς αύξηση δόσης) ενώ οι υπόλοιποι άλλαξαν σε ή προστέθηκε HCQ (12%), SSZ (5%), LEF (9%) ή άλλαξαν σε SC MTX (4%) (*παρόμοια ευρήματα και στο USCHP*)
- Στο εθνικό σύστημα ασφάλειας, το **19% των ασθενών που ξεκίνησαν με MTX έλαβαν βιολογικό παράγοντα** (κυρίως αντι-TNF-α), εκ των οποίων το 33% δεν έλαβε ποτέ MTX δόση > 15 mg
- Στο σύστημα των εμπορικών ασφαλιστικών εταιριών (commercially insured patients), το **35% έλαβε βιολογικό παράγοντα** (κυρίως αντι-TNF-α, 90%), εκ των οποίων το 22% ποτέ δεν έλαβε MTX > 15mg/w

Use of Oral and Subcutaneous Methotrexate in Rheumatoid Arthritis Patients in the United States Jeffrey R Curtis, Jie Zhang, Fenglong Xie, Tim Beukelman, Lang Chen, Joaquim Fernandes, Seth Ginsberg, Claire Spettell, Hui Feng Yun, Kenneth G Saag and Michael Schiff. Arthritis Care & Research Accepted manuscript online: 18 JUN 2014 09:12AM EST | DOI: 10.1002/acr.22383

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη